

Saúde oral

Check-up Ortodontico: Perguntas e Respostas



Dr.^a Susana Falarde Ramos
Médico Dentista

1 - Com que idade deve uma criança efectuar check up ortodontico?

Com 7 anos a menos que se suspeite de um problema precocemente.

2 - Porque deverá ser efectuado checkup nesta idade?

Diagnosticar e tratar precocemente favorece e orienta erupção dentária definitiva. O tratamento precoce interceptivo reduz e facilita o tempo de tratamento, assim como torna-o menos dispendioso.

3 - Qual o impacto psicológico do tratamento precoce?

A aparência esta relacionada com popularidade, comportamento social, auto-estima e estilo pessoal.

Em crianças o tratamento é muito receptivo, os adolescentes são mais críticos e menos receptivos e colaborantes.

4 - Quais os benefícios do tratamento Ortodontico?

Melhoria da função mastigatória, dicção, estética e facilidade na higienização, padrões de uso mais favoráveis e claro maior longevidade dos dentes naturais, facilita tratamentos necessários, previne e trata problemas periodontais prevenindo e ou reduzindo perdas de osso alveolar, melhoria da auto estima e auto-confiança.

5 - Porquê é importante o crescimento durante a puberdade no tratamento Ortodontico?

É nesta fase que ocorre o desenvolvimento do esqueleto facial. O tratamento nesta fase permite ao ortodontista influenciar favoravelmente no perfil facial. Uma vez terminado o crescimento dos ossos da face, corrigir as discrepâncias esqueléticas normalmente requer cirurgia maxilar.

6 - Existe limite de idade para tratamento Ortodontico?

A idade não é impedimento. Pacientes com dentes saudáveis e bom suporte ósseo são sempre candidatos a terapia ortodontica.

7 - O porquê do estudo cefalometrico?


O estudo cefalometrico consiste na avaliação radiográfica de padrões de crescimento cranio-

-facial. É de primordial importância e deve ser sempre realizado em pacientes que pretendem efectuar correcção dentária ou avaliar a necessidade da mesma. Para o efeito o paciente deverá realizar: Ortopantomografia; Telerradiografia de perfil ou frontal; rx punho (para determinar idade óssea), modelos de estudo e história clínica.

O resultado deste estudo determina qual o aparelho adequado a cada caso clínico a terapêutica a seguir e o tempo de tratamento.

8 - Quais os sinais de alerta a que os pais devem estar atentos?

Os pais devem estar atentos aos seguintes sinais: perda precoce ou tardia de dentes de leite; dificuldade em mastigar ou morder; respiração oral nocturna; roncopatia (ressonar); ruídos maxilares; dificuldades de dicção; assimetria facial e bruxismo (vulgo “ranger os dentes”) devem neste caso, procurar zonas de desgaste de esmalte.



www.clinicadaatalaia.com

Rua dos Ex-Votos, 211 - 2870-723 Atalaia

Tel.: 21 230 80 97